


Gelsectan® UNE FORMULATION ORIGINALE POUR UN MODE D'ACTION INNOVANT

FILM MUCO-PROTECTEUR¹

**XYLOGLUCANE
ET PROTÉINES VÉGÉTALES**

Propriétés filmogènes^{1,2}

Blocage du passage de molécules ou
de micro-organismes induisant une inflammation



PRÉBIOTIQUE¹

XYLO-OLIGOSACCHARIDE

**Stimulation de la production
de bifidobactéries³**



Restauration du microbiote intestinal

RENFORCEMENT DE LA BARRIÈRE INTESTINALE

**UNE ACTION SYNERGIQUE POUR SOULAGER ET PRÉVENIR
LES SYMPTÔMES DU SII⁴**

Douleurs abdominales, ballonnements, troubles du transit

1- Dossier technique GELSECTAN®.

2- Eutamène et al. Poster DDW 2018 – Abstract Gastroenterology 2018.

3- Finegold SM et al. Xylooligosaccharide increases bifidobacteria but not lactobacilli in human gut microbiota. Food Funct.2014;5(3):436-45.

4- Instructions d'utilisation GELSECTAN®.

**SYNDROME
DE L'INTESTIN
IRRITABLE**

**Ballonnements
Douleurs
Troubles du transit**

Gelsectan®
RENFORCER LA BARRIÈRE INTESTINALE
POUR AGIR SUR LES SYMPTÔMES

ACTION | PROTECTION | INNOVATION

FR/GEL/0719/0006 – Juillet 2019 – Swallow Cooper Paris



RENFORCER LA BARRIÈRE INTESTINALE POUR AGIR SUR LES SYMPTÔMES DU SII

Bon Usage⁴

Indication d'utilisation

GELSECTAN® est destiné à restaurer la fonction intestinale chez les patients présentant des symptômes dus :

- au Syndrome de l'Intestin Irritable (SII),
- à une hypersensibilité intestinale,
- ou à la prise de certains médicaments, pour soulager et prévenir des symptômes tels que diarrhée chronique ou récidivante, tension abdominale, douleur, ballonnements et flatulences.

Mode d'emploi

Avaler la gélule avec une boisson.

Posologie

1 ou 2 gélules selon la sévérité des symptômes, deux fois par jour (le matin avant le petit-déjeuner et le soir avant le dîner) pendant 2 à 4 semaines. Le traitement peut être maintenu plus longtemps si nécessaire.

Mises en garde

- Il n'est pas nécessaire de consulter un médecin avant d'utiliser ce produit. Cependant, la consultation d'un médecin est recommandée en cas de symptômes graves ou persistants ou lorsqu'il existe des doutes sur le diagnostic, en particulier chez les personnes âgées.
- Ce dispositif médical ne constitue pas un traitement pharmacologique. Si un professionnel de santé envisage un traitement pharmacologique, il peut être pris concomitamment avec ce produit.
- Bien qu'aucun effet indésirable ne soit connu, il est recommandé de ne pas utiliser ce produit pendant la grossesse ou les premiers mois de l'allaitement, sauf indication contraire d'un professionnel de santé.
- Ne pas utiliser ce produit après la date de péremption mentionnée sur l'emballage.
- Ne pas utiliser le produit si la plaquette est ouverte ou endommagée.
- À conserver à une température ne dépassant pas 25 °C. Ne pas congeler.
- Tenir le produit hors de la portée des enfants.

Contre-indications

GELSECTAN® ne doit pas être utilisé chez des patients présentant une hypersensibilité connue au xyloglucane ou à l'un des autres composants du produit.

Dispositif de classe IIa.

Marquage CE accordé par Kiwa Cermet.

Dispositif non pris en charge par l'Assurance Maladie.



CE 0476

FABRICANT

NOVENTURE, S.L.
Calle Consejo de Ciento, 333
08007 Barcelona (Espagne)

DISTRIBUTEUR

NORGINE SAS
2 rue Jacques Daguerre
92500 Rueil-Malmaison (France)

En pratique⁴

POSOLOGIE

ou par prise deux fois par jour

à prendre avec une boisson

avant le petit-déjeuner et avant le dîner

Pendant 2 à 4 semaines
(Possibilité de prolongation du traitement si nécessaire.)

Boîte de 60 gélules

Non remboursé par la Sécurité Sociale



GELSECTAN est une marque déposée de Noventure S.L faisant l'objet d'une licence accordée au groupe de sociétés Norgine.
NORGINE et le logo avec la voile sont des marques déposées du groupe de sociétés Norgine.

4- Instructions d'utilisation GELSECTAN®.



SYNDROME DE L'INTESTIN IRRITABLE



Gelsectan®

ACTION | PROTECTION | INNOVATION

