



COCCULINE® Nouvelle indication

Solution conseil n°1¹ à l'officine pour le mal des transports, **COCCULINE®** est désormais également indiqué en cas de nausées et vomissements sans fièvre, d'origines diverses. Sans effet secondaire connu, ni interaction médicamenteuse, le médicament homéopathique **COCCULINE®** s'adresse à tous dès 18 mois².

Nausées et vomissements sans fièvre

Les nausées et vomissements sans fièvre peuvent survenir dans divers cas :

- La **nausée** est une sensation désagréable au niveau de l'estomac et de la gorge qui correspond à une envie de vomir ;
- Le **vomissement** est le rejet du contenu de l'estomac par la bouche. C'est un réflexe mécanique de défense de l'organisme destiné à vider l'estomac, commandé par le cerveau. Ce signal peut venir du tube digestif (intoxication orale), de l'oreille interne (mal des transports) et du cerveau (pensées, odeurs, images, émotions).

Leurs causes sont multiples mais le plus souvent ces symptômes sont bénins.

Ils pourront être accompagnés de sueurs froides, pâleurs, hyper salivation ou sensation de malaise.

COCCULINE®, une solution adaptée

Indiqué dans les **nausées et vomissements sans fièvre et le mal des transports**, le médicament homéopathique **COCCULINE®** :

- associe **4 substances actives** : Cocculus indicus 4 CH, Nux vomica 4 CH, Tabacum 4 CH, Petroleum 4 CH ;
- s'adresse à **toute la famille**, à partir de l'âge de 18 mois² ;
- est **sans somnolence, sans interaction médicamenteuse, ni accoutumance** ;
- est disponible en **2 formats** faciles à prendre et à transporter : comprimés orodispersibles et doses de granules.

1 Source : IQVIA, CAM Novembre 2019

2 Avant 6 ans, pour les nausées et vomissements sans fièvre : prendre un avis médical

Posologie et mode d'administration

Comprimé orodispersible Voie sublinguale.	Granules en récipient unidose Voie sublinguale. Laisser fondre les granules sous la langue.
Chez l'enfant de 18 mois à 6 ans, faire dissoudre le comprimé/les granules dans un peu d'eau avant la prise en raison du risque de fausse route.	
Dans les nausées et vomissements sans fièvre	
Médicament réservé à l'adulte et l'enfant de plus de 18 mois. Un avis médical doit être pris chez l'enfant de 18 mois à 6 ans.	
Dès l'apparition des symptômes, 1 comprimé à sucer à chaque nausée et/ou vomissement. A espacer selon amélioration. Ne pas dépasser 6 comprimés par jour.	Dès l'apparition des symptômes, 1 dose de granules. Si les symptômes persistent, renouveler la prise. Ne pas dépasser 3 doses par jour.
Cesser les prises dès la disparition des symptômes. La durée du traitement sans avis médical ne doit pas dépasser 48 heures.	
Dans le mal des transports	
Médicament réservé à l'adulte et l'enfant de plus de 18 mois.	
Chez l'adulte : 2 comprimés à sucer 3 fois par jour la veille et le jour du voyage. 2 comprimés à sucer dès l'apparition des symptômes. Renouveler la prise si nécessaire. Chez l'enfant : 1 comprimé à sucer 3 fois par jour la veille et le jour du voyage. 1 comprimé à sucer dès l'apparition des symptômes. Renouveler la prise si nécessaire. Ne pas dépasser 6 comprimés par jour.	1 dose de granules la veille et 1 dose juste avant le départ. 1 dose de granules dès l'apparition des symptômes. Renouveler la prise si nécessaire.
Cesser les prises dès la disparition des symptômes.	

COCCULINE® est un médicament, disponible sans ordonnance.

Nouvelle indication disponible en pharmacie à compter de mars 2020.

Prix publics moyens constatés :

- 6,00 € la boîte de 40 comprimés orodispersibles

- 7,60 € la boîte de 6 doses

Source : IQVIA, CAM Novembre 2019